

Patologie cardiache e COVID-19

Le persone con patologie cardiache hanno un rischio maggiore di contrarre il COVID-19?

- No. Tutti possono contrarre il COVID-19
- La migliore prevenzione è **seguire rigorosamente le raccomandazioni** (distanziamento sociale, lavaggio frequente delle mani, autoisolamento)

Le persone con patologie cardiache hanno un rischio maggiore di sviluppare sintomi gravi se contraggono l'infezione da COVID-19?

- La maggior parte delle persone che contraggono il COVID-19 manifestano sintomi lievi o addirittura nessun sintomo.
- Il virus **non** sembra infettare i dispositivi cardiaci impiantati (pacemaker e defibrillatori) né le valvole cardiache in persone con patologie valvolari cardiache.
- Le persone con patologie cardiache **possono** avere un **rischio maggiore di avere sintomi gravi**.
- La European Society of Cardiology ha identificato i pazienti con cardiopatie congenite cianogene come un gruppo ad alto rischio di complicanze. Le cardiopatie congenite cianogene includono la tetralogia di Fallot, che è una caratteristica di alcune persone con delezione 22q11.2.
- Altre comorbidità (come immunodeficit, diabete, ipertensione e / o sovrappeso) aumentano il rischio di sviluppare sintomi più gravi.
- Il modo migliore per evitare di manifestare sintomi gravi è non contrarre il COVID-19!

COVID-19 può causare ulteriori problemi al cuore?

- E' possibile. COVID-19 può causare una reazione infiammatoria nel corpo che può compromettere la funzione del cardiaca o eventualmente determinare un'inflammatione specifica del muscolo cardiaco.
- Il modo migliore per evitare ulteriori problemi è non contrarre il COVID-19!

Devo interrompere o modificare i miei farmaci?

- **NO**. Si prega di **NON** interrompere o modificare le terapie in atto (come quelle le vostre patologie cardiache e per la pressione sanguigna) a meno che il medico non lo ritenga opportuno.

Dovrei restare a casa o andare in ospedale?

Se hai **sintomi lievi**, resta a **casa** e **contatta** il tuo **medico di base**.

Chiama un'ambulanza per andare in ospedale se hai sintomi gravi.

I medici possono aiutarti, ma solo se arrivi in ospedale in tempo.

Stai a casa /contatta il medico di base per:

- Tosse lieve
- Febbre gestibile



Chiama il 118 per:

- Peggioramento del dolore toracico
- Fiato corto
- Palpitazioni
- Svenimento / vertigini



The International
22q11.2 Foundation Inc.

Aidel22

Associazione Italiana delezione del Cromosoma 22 E.T.S.
Associazione di Promozione Sociale

La missione della International 22q11.2 Foundation è di migliorare la qualità di vita delle persone con sindrome da delezione 22q11.2 attraverso le collaborazioni con Associazioni di familiari e professionisti.

Queste informazioni sono fornite International 22q11.2 Foundation solo a scopo didattico. Non vanno intese come consiglio medico. In caso di dubbi, si prega di contattare il proprio medico curante.